Auftragsinformationen

IDL Worldwide

IDL Auftrags-Nr.:	400847154-F01	Status:	Freigabe				
Stichwort:	Tetra Medica Contralck Plus			Material-Nr.:	TH52418	Filmnr.: 1	Stanzkontur: 650X230MM
Druckerei:			Offset Printing	Rezeptur-Nr.:			Füllmenge: 20ml
Rasterweite:	Strich	Maßstab: 1:1	Datum: 15.03.2018	Warengruppe:	GEBRAUCHSANWEISUNG		Sprachversion: MO

Code-Arten:
Code-Nr.:
Proof-Ident.-Nr.:

IDL Kundenberater: Markus Amft
Telefon: +49 5321 3715538
e-mail: m.amft@idlww.de

Bemerkungen: **Achtung Strichcode ist Muster!** Bitte Codierung gemäß Druckspezifikation ersetzen.
Attention bar code is a sample! The encoding is only a reference! Please replace with specification for printing.

Bitte erteilen Sie nach Prüfung der Korrektur eine schriftliche Freigabe an Ihren Verpackungshersteller!

☑ **Standproof**
Nicht farbtonverbindlich . Nur zur Überprüfung von Stand- und Farbverteilung.
Not binding in colour. Only check layout and ink distribution.

☐ **Proof**
Der Proof ist farbverbindlich. Angaben von Sonderfarben dienen lediglich als Farb-Basiswert.
Die Farbtöne weichen prozess- und substratbedingt von der Farbvorgabe ab.
Simuliert den Druck auf gestrichenem Bedruckstoff. Keine Dichtemessung möglich.
The proof is reference for colour. The stated spot colours are only colour guide values.
Due to process and substrate being used the colouring deviates from the default colouring.
Simulates printing on coated printing material. No measuring of density possible.

100% 80% 40%
Black

Proof-Freigabe

Status	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift
FREI				

650 mm

230 mm

UK Information and directions for use

Pharmaceutical entrepreneur: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germany, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Manufacturer: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany

Tetra Medica Contralck Plus

Method of administration: Solution for adding to aquarium water

Amount of active ingredients per 1 ml of solution: 2.5 mg of methylthioninium chloride, 1.0 mg of malachite green oxalate, 0.5 mg of methylrosanilinium chloride, 0.3 mg of acriflavinium chloride

Areas of application: White spot disease (Ichthyophthirius multifiliis) and other skin and gill parasites such as Trichodina and Chilodonella.

Disease symptoms: White spots or patches on skin and fins, shaky and rubbing movements, clamped fins, rapid breathing, dull mucous membranes.

Contraindications and side effects: None known. The pet owner is respectfully asked to inform a veterinarian or pharmacist of any newly-discovered side effect. The pet retailer or product manufacturer should also be informed of any side effects.

Remedy for freshwater tropical fish

Dosing instructions/Method of application: Shake well before use. The treatment cycle for **Tetra Medica Contralck Plus** lasts for 8 days. During treatment, please ensure that the aquarium is well aerated. Switch off any UV clarifiers and ozone systems. Do not use activated carbon or any other absorbent filter media to filter the water. Wherever possible, please clean the filter properly before use. Always ensure that treatment is carried out which the tank is fully stocked to prevent any currently healthy animals from subsequently becoming infected. Dispense **Tetra Medica Contralck Plus** evenly into the aquarium in the amounts as stipulated below:
Day 1: 20 drops (1 ml) per 100 l of aquarium water. You are advised not to feed the fish.
Day 2: 20 drops (1 ml) per 100 l of aquarium water. You are advised not to feed the fish.
Days 3 to 6: No application. Feed as normal.
Day 7: 20 drops (1 ml) per 100 l of aquarium water. You are advised not to feed the fish.
Day 8: No application. Feed as normal. Carry out a partial water change (30-50%). After the partial water change we recommend you to use activated carbon to filter the water.

Repeat treatment is recommended directly afterwards, particularly if white-spot disease persists.

Water discoloration is due to the active substance and will disappear after a few days.

Instructions for appropriate use:
- Do not use **Tetra Medica Contralck Plus** in conjunction with any other disease remedies
- If excessive amounts of the product are added to the aquarium, carry out a partial water change equivalent to those amounts.

Special storage precautions:
- Keep this remedy out of the reach and sight of children.
- Store the product in its original packaging.
- Keep the product away from sunlight.

Special precautions:
- For animal treatment only.
- Do not use once the expiry date has passed.
- This product should not be used on crustaceans, shrimps, snails, mussels and other invertebrates as it can lead to intolerance.
- May be harmful to delicate plant species such as Ceratophyllum genus (hornwort).
- Special precautionary measures for disposal of unused remedies:
- Dispose of this product and its packaging at a hazardous or special waste collection point.

Information revised:
October 2017

D Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germany, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Importeur für die Schweiz: Delphin Amazonia AG, Ruchfeldstr. 15, CH-4142 Münchenstein, Switzerland, Tel.: +41 (0)61 416 10 10

Hersteller: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany

Tetra Medica Contralck Plus

Darreichungsform: Wirkstofflösung als Zusatz zum Aquarienwasser

Wirkstoffe je 1 ml Lösung: 2,5 mg Methylthioninium chlorid, 1,0 mg Malachitgrünoxalat, 0,5 mg Methylrosanilinium chlorid, 0,3 mg Acriflaviniummonochlorid

Anwendungsgebiete: Weißpunktkrankheit (Ichthyophthirius multifiliis) und andere Haut- und Kiemenparasiten wie Trichodina und Chilodonella.

Krankheitssymptome: Weiße Punkte oder Beläge auf Haut und Flossen, schütteln und scheuernde Schwimmbewegungen, Flossenklemmen, schnelle Atmung, Schleimhautrötung.

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen: Keine bekannt. Der Tierhalter wird aufgefordert, jede Nebenwirkung, die bisher nicht bekannt ist, einem Tierarzt oder Apotheker mitzuteilen. Außerdem sollten die Nebenwirkungen dem Zoofachhändler oder dem Hersteller mitgeteilt werden.

Arzneimittel für Süßwasserzierfische

Dosieranleitung/Art und Weise der Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Ein Behandlungszyklus von **Tetra Medica Contralck Plus** dauert 8 Tage. Während der Behandlung das Aquarium gut belüften. UV-Klärer und Ozon-Anlagen ausschalten. Nicht über Aktivkohle oder andere absorbierende Filtermedien filtern. Wenn möglich bitte Filter vor der Anwendung fach- und sachgerecht reinigen. Die Behandlung immer im vollbesetzten Becken durchführen, um eine Ansteckung noch nicht befallener Tiere zu verhindern. **Tetra Medica Contralck Plus** wie folgt in den angegebenen Mengen gleichmäßig im Aquarium verteilen:
1. Tag: 20 Tropfen (1 ml) je 100 l Aquarienwasser. Möglichst nicht füttern.
2. Tag: 20 Tropfen (1 ml) je 100 l Aquarienwasser. Möglichst nicht füttern.
3. - 6. Tag: Keine Anwendung. Normal füttern.
7. Tag: 20 Tropfen (1 ml) je 100 l Aquarienwasser. Möglichst nicht füttern.
8. Tag: Keine Anwendung. Normal füttern. Teilwasserwechsel (30-50%) durchführen. Wir empfehlen nach dem Teilwasserwechsel mit Aktivkohle zu filtern.

Eine Wiederholungsbehandlung ist direkt im Anschluss empfehlenswert, besonders bei der Weißpunktkrankheit.

Die Wasserfärbung ist wirkstoffbedingt und verschwindet nach einigen Tagen wieder.

Hinweise für die bestimmungsgemäße Anwendung:
- **Tetra Medica Contralck Plus** nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln anwenden.
- Im Falle einer Überdosierung entsprechend der Überdosierungsmenge das Aquarienwasser wechseln.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung:
- Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.
- In der Originalverpackung aufbewahren.
- Vor Lichteinstrahlung schützen.

Besondere Warnhinweise:
- Für Tiere.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.
- Krebstiere, Garnelen, Schnecken, Muscheln und andere Wirbellose von der Behandlung ausschließen, da Unverträglichkeiten auftreten können.
- Feinfiedrige Pflanzen, wie z. B. Ceratophyllum-Arten (Hornkraut) können geschädigt werden.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln:
- Dieses Produkt und seine Verpackung der Problemabfallentsorgung zuführen.

Stand der Information:
Oktober 2017

F Informations et instructions d'utilisation

Entreprise pharmaceutique : Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Allemagne, Tél. +49 (0) 5422/105-0, Fabriqué en Allemagne, www.tetra.net

Fabricant : Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Allemagne

Tetra Medica Contralck Plus

Mode d'administration : solution à ajouter à l'eau de l'aquarium

Ingrédients actifs pour 1 ml de solution : 2,5 mg de chlorure de méthylthioninium, 1,0 mg d'oxalate de vert de malachite, 0,5 mg de chlorure de méthylrosaniline, 0,3 mg de chlorure d'acriflavinium

Champs d'application : maladie des points blancs (Ichthyophthirius multifiliis) et autres parasites de la peau et des branchies tels que Trichodina et Chilodonella.

Symptômes de la maladie : points blancs ou dépôts sur la peau et les nageoires, tremblements et mouvements de frottement, nageoires bloquées, respiration rapide et opacité des muqueuses.

Contre-indication et effets secondaires : aucun connu actuellement. Si vous constatez un effet secondaire, nous vous invitons à en informer un vétérinaire ou un pharmacien, ainsi que votre boutique d'aquariophilie ou le fabricant du produit.

Médicament pour poissons d'ornement d'eau douce

Instructions de dosage/mode d'application : bien agiter avant usage. Pour **Tetra Medica Contralck Plus**, le cycle de traitement dure 8 jours. Pendant le traitement, s'assurer que l'aquarium est bien aéré. Éteindre toutes les lampes UV et systèmes d'ozone. Ne pas utiliser de charbon actif ou tout autre matériau filtrant absorbant pour filtrer l'eau. Dans la mesure du possible, nettoyer correctement le filtre avant utilisation. Veiller systématiquement à réaliser le traitement lorsque l'aquarium est entièrement peuplé afin d'empêcher que des animaux en bonne santé ne soient infectés par la suite. Répartir **Tetra Medica Contralck Plus** uniformément dans l'aquarium en respectant les dosages ci-dessous.
Jour 1 : 20 gouttes (1 ml) pour 100 l d'eau d'aquarium. Il est conseillé de ne pas nourrir les poissons.
Jour 2 : 20 gouttes (1 ml) pour 100 l d'eau d'aquarium. Il est conseillé de ne pas nourrir les poissons.
Jours 3 à 6 : pas d'application. Nourrir normalement les poissons.
Jour 7 : 20 gouttes (1 ml) pour 100 l d'eau d'aquarium. Il est conseillé de ne pas nourrir les poissons.
Jour 8 : pas d'application. Nourrir normalement les poissons. Effectuer un changement d'eau partiel (30-50 %). Après le changement d'eau partiel, il est recommandé d'utiliser du charbon actif pour filtrer l'eau.

Il est recommandé de répéter le traitement aussitôt après, en particulier si la maladie des points blancs persiste.

La décoloration de l'eau est due à la substance active et disparaîtra après quelques jours.

Mode d'emploi :
- Ne pas utiliser **Tetra Medica Contralck Plus** en association avec d'autres traitements contre des maladies
- Si une quantité excessive de produit est ajoutée à l'aquarium, procéder à un changement d'eau partiel équivalant à cette quantité

Précautions particulières de stockage :
- Conserver ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine.
- Conserver le produit à l'abri de la lumière du soleil.

Précautions particulières :
- Pour traiter les animaux uniquement.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sur les crustacés, crevettes, escargots, moules et autres invertébrés car il peut entraîner une intolérance.
- Peut se révéler nocif pour les espèces de plantes fragiles, comme celles du genre Ceratophylle (ambocéréolés).
- Mesures de précaution particulières pour l'élimination des médicaments non utilisés :
- Éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Informations mises à jour : Octobre 2017

NL Informatie en aanwijzingen voor gebruik

Farmaceutisch ondernemer: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Duitsland, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Fabrikant: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Duitsland

Tetra Medica Contralck Plus

Wijze van toediening: Oplossing voor toevoeging aan aquariumwater

Hoeveelheid werkzame stoffen per 1 ml oplossing: 2,5 mg methylthioninium chloride, 1,0 mg malachietgroenoxalaat, 0,5 mg methylrosaniliniumchloride, 0,3 mg acriflaviniumchloride

Toepassingsgebieden: Witte stip (Ichthyophthirius multifiliis) en andere huid- en kieuwparasieten zoals Trichodina en Chilodonella.

Ziekteverschijnselen: Witte stijpjes of plekken op de huid en vinnen, schokkerige en wrijvende bewegingen, vinklippen, snelle ademhaling, doffe slijmhuid.

Contra-indicaties en bijwerkingen: Geen bekend. De eigenaar van het huisdier wordt vriendelijk verzocht om een dierenarts of apotheker op de hoogte te brengen van elke nieuw ontdekte bijwerking. De dierenwinkel of fabrikant van het product moet ook worden geïnformeerd over eventuele bijwerkingen.

Geneesmiddel voor tropische zoetwatervissen

Doseerinstructies/wijze van toediening: Goed schudden voor gebruik. De behandelingscyclus voor **Tetra Medica Contralck Plus** duurt 8 dagen. Zorg er tijdens de behandeling voor dat het aquarium goed wordt beluchtt. Schakel UV-algenverdelgers en ozonsystemen uit. Gebruik geen actieve kool of andere absorberende filtermedia om het water te filteren. Maak waar mogelijk het filter voor gebruik goed schoon. Voer de behandeling altijd uit met het volledige visbestand in het aquarium, om te voorkomen dat momenteel gezonde dieren naderhand besmet raken. **Tetra Medica Contralck Plus** gelijkmatig over het aquarium verdelen in de onderstaande hoeveelheden:
Dag 1: 20 druppels (1 ml) per 100 liter aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 2: 20 druppels (1 ml) per 100 liter aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 3 t/m 6: Geen toediening. Normaal voeren.
Dag 7: 20 druppels (1 ml) per 100 liter aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 8: Geen toediening. Normaal voeren. Een deel van het water verversen (30-50%). Na de gedeeltelijke waterverversing raden we aan om actieve kool te gebruiken om het water te filteren.

Aanbevolen wordt de behandeling direct daarna te herhalen, vooral als de ziekte witte stip aanhoudt.

Waterverkleuring is het gevolg van de werkzame stof en verdwijnt na een paar dagen.

Aanwijzingen voor correct gebruik:
- **Tetra Medica Contralck Plus** niet gebruiken in combinatie met andere middelen tegen ziekten
- Als er te grote hoeveelheden van het product aan het aquarium worden toegevoegd, ververs dan een evenredig deel van het water

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het bewaren:
- Dit geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- Het product uit de buurt van zonlicht houden.

Speciale voorzorgsmaatregelen:
- Voor dierengeneeskundig gebruik.
- Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- Dit product mag niet worden gebruikt op kreeftachtigen, garnalen, slakken, mosselen en andere ongewervelde dieren, omdat dit kan leiden tot intolerantie.
- Kan schadelijk zijn voor gevoelige plantensoorten zoals het geslacht Ceratophyllum (hoornblad).
- Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van ongebruikte geneesmiddelen:
- Dit product en zijn verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Informatie herzien: Oktober 2017

I Informazioni e modo d'uso

Impresa farmaceutica Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germania, Tel. + 49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Produttore: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germania

Tetra Medica Contralck Plus

Modalità di somministrazione: Agente attivo in soluzione da aggiungere all'acqua dell'acquario

Quantità di principi attivi ogni 1 ml di soluzione: 2,5 mg di cloruro di metiltioninio, 1,0 mg di ossalato verde di malachite, 0,5 mg di cloruro di metilrosanilina, 0,3 mg di cloruro di acriflavino

Ambiti di applicazione: Ictioftiriasi (Ichthyophthirius multifiliis, malattia dei puntini bianchi) e parassiti di pelle e branchie quali Trichodina e Chilodonella.

Sintomi: Puntini o chiazze bianche su pelle e pinne, tremore, sfregamento contro oggetti, immobilità delle pinne e respirazione accelerata, membrane delle mucose opache.

Controindicazioni ed effetti collaterali: Nessuno noto. In caso si riscontrino effetti collaterali non rilevati in precedenza, si prega di informare il veterinario o il farmacista. È inoltre necessario avvisare il rivenditore e il produttore in merito alla comparsa di effetti collaterali.

Rimedio per pesci tropicali d'acqua dolce

Istruzioni relative a dosaggio/Metodo di applicazione: Agitare bene prima dell'uso. Il ciclo di trattamento per **Tetra Medica Contralck Plus** dura 8 giorni. Durante il trattamento, accertarsi che l'acquario sia sempre ben areato. Spegnere eventuali sterilizzatori UV e sistemi a ozono. Non utilizzare filtri ai carboni attivi o altri filtri assorbenti per filtrare l'acqua. Quando possibile, pulire accuratamente il filtro prima dell'uso. Assicurarsi che il trattamento sia eseguito con tutti i pesci all'interno della vasca, in modo da evitare che eventuali individui sani possano ammalarsi successivamente. Distribuire **Tetra Medica Contralck Plus** in modo uniforme nell'acquario seguendo le indicazioni riportate di seguito:
Giorno 1: 20 gocce (1 ml) ogni 100 l di acqua dell'acquario. Si sconsiglia di nutrire i pesci.
Giorno 2: 20 gocce (1 ml) ogni 100 l di acqua dell'acquario. Si sconsiglia di nutrire i pesci.
Da giorno 3 a giorno 6: Nessuna somministrazione. Alimentare normalmente.
Giorno 7: 20 gocce (1 ml) ogni 100 l di acqua dell'acquario. Si sconsiglia di nutrire i pesci.
Giorno 8: Nessuna somministrazione. Alimentare normalmente. Eseguire settimanalmente una sostituzione parziale dell'acqua (30-50%). Dopo il cambio parziale dell'acqua, si consiglia di utilizzare un filtro ai carboni attivi.

È opportuno ripetere subito il trattamento, specialmente se i puntini bianchi persistono.

La colorazione dell'acqua dovuta alle sostanze attive scomparirà dopo qualche giorno.

Istruzioni per un uso adeguato:
- Non utilizzare **Tetra Medica Contralck Plus** in combinazione con altri rimedi.
- Nel caso sia stato immesso nell'acquario un quantitativo eccessivo di prodotto, eseguire una sostituzione parziale dell'acqua pari al sovradosaggio

Precauzioni speciali di conservazione:
- Mantenere il prodotto fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Conservare il prodotto nell'imballo originale.
- Non esporre il prodotto alla luce solare.

Precauzioni speciali:
- Adatto soltanto per gli animali.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare su crostacei, gamberetti, lumache, molluschi e altri invertebrati in quanto può provocare intolleranze.
- Potrebbe risultare dannoso per alcune specie di piante delicate, come quelle appartenenti alla specie Ceratophyllum genus (ceratofillo comune).
- Precauzioni speciali per lo smaltimento dei prodotti inutilizzati:
- Smaltire il prodotto e la relativa confezione come rifiuti speciali o pericolosi presso un apposito punto di raccolta.

Revisione delle informazioni: Ottobre 2017

E Información e instrucciones de uso

Empresa farmacéutica: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Alemania, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Fabricante: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Alemania

Tetra Medica Contralck Plus

Formulación: solución para añadir al agua del acuario

Cantidad de ingredientes activos en 1 ml de solución: 2,5 mg de cloruro de metiltionina, 1,0 mg de oxalato de verde malaquita, 0,5 mg de cloruro de metilrosanilina, 0,3 mg de cloruro de acriflavina

Campos de aplicación: enfermedad de los puntos blancos (Ichthyophthirius multifiliis) y otros parásitos de la piel y las agallas, tales como Trichodina y Chilodonella.

Sintomatología: puntos o engrosamientos blancos en la piel y las agallas, movimientos nerviosos y frotación contra objetos, aletas pegadas al cuerpo, respiración , tono apagado de las membranas mucosas.

Contraindicaciones y efectos secundarios: no se conocen. Se ruega a los propietarios de animales que informen a un veterinario o a un farmacéutico de cualquier efecto secundario desconocido hasta ahora. El distribuidor especializado o el fabricante del producto también deben ser informados de los efectos secundarios.

Medicamento para peces tropicales de agua dulce

Dosificación/Modo de aplicación: agite bien antes de usar. El ciclo de tratamiento de **Tetra Medica Contralck Plus** tiene una duración de 8 días. Asegúrese de que el acuario esté bien aireado durante el tratamiento. Desconecte los acladoores UV y los sistemas de ozono. No utilice carbón activo ni otros medios absorbentes para filtrar el agua. A ser posible, limpie el filtro adecuadamente antes de cada uso. Cerciórese de realizar el tratamiento cuando el tanque esté completo para evitar que se infecten más adelante animales sanos. Distribuya **Tetra Medica Contralck Plus** uniformemente en el acuario en las cantidades especificadas a continuación:
Día 1: 20 gotas (1 ml) por cada 100 l de agua de acuario. Se aconseja no alimentar a los peces.
Día 2: 20 gotas (1 ml) por cada 100 l de agua de acuario. Se aconseja no alimentar a los peces.
Días 3 a 6 No administrar. Alimentar de manera normal.
Día 7: 20 gotas (1 ml) por cada 100 l de agua de acuario. Se aconseja no alimentar a los peces.
Día 8: No administrar. Alimentar de manera normal. Realice un cambio de agua parcial (30-50%). Tras el cambio de agua parcial, le recomendamos la utilización de carbón activo para filtrar el agua.

Se recomienda repetir el tratamiento justo después, sobre todo si la enfermedad de los puntos blancos persiste.

El cambio de color del agua se debe a la sustancia activa y desaparecerá pasados unos días.

Indicaciones para una utilización apropiada:
- No utilice **Tetra Medica Contralck Plus** junto con otros medicamentos
- Si se añaden cantidades excesivas de producto al acuario, realice un cambio de agua parcial equivalente a tales cantidades

Precauciones de conservación especiales:
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.
- Guarde el producto en su envase original.
- Proteja el producto de la luz solar directa.

Precauciones especiales:
- Uso veterinario.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Este producto no debe utilizarse con crustáceos, gambas, caracoles, mejillones y otros invertebrados, porque puede provocar intolerancia.
- Puede ser nocivo para especies de plantas delicadas, tales como Ceratophyllum genus (ceratón).
- Medidas de precaución especiales para eliminación de medicamentos no utilizados:
- Deseche este producto y su envase en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales.

Información revisada:
octubre de 2017

P Informação e instruções de utilização

Empresa farmacêutica: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Alemanha, Tel.: +49 (0) 5422/105-0, Fabricado na Alemanha, www.tetra.net

Fabricante: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Alemanha

Tetra Medica Contralck Plus

Modo de administração: Solução para adicionar à água dos aquários

Quantidade de ingredientes activos por 1 ml de solução: 2,5 mg de cloreto de metiltioninio, 1,0 mg de oxalato de verde de malaquite, 0,5 mg de cloreto de metilrosaninilina, 0,3 mg de cloreto de acriflavina

Indicações terapêuticas: Doença dos pontos brancos (Ichthyophthirius multifiliis). Indicada para combater outros parasitas da pele e guelras, tais como Trichodina e Chilodonella.

Sintomas da doença: Pontos ou manchas brancas na pele e barbatanas, movimentos instáveis e de fricção, barbatanas presas, respiração rápida, mucosas baças.

Contraindicações e efeitos secundários: Nenhuma conhecida. Pede-se ao proprietário dos animais o favor de informar o veterinário ou farmacêutico caso verifique qualquer novo efeito secundário. O distribuidor ou fabricante do produto também deverá ser informado de quaisquer efeitos secundários.

Medicamento para peixes tropicais de água doce

Instruções de dosagem/método de aplicação: Agitar bem antes de usar. O ciclo de tratamento de **Tetra Medica Contralck Plus** tem a duração de 8 dias. Durante o tratamento, deve ventilar bem o aquário. Desligue todos os esterilizadores UV e sistemas de ozono. Não utilize carvão ativado ou outro tipo de filtro absorvente para filtrar a água. Se for possível, limpe o filtro adequadamente antes de cada uso. Certifique-se sempre que o tratamento é efetuado com todos os peixes no tanque, para impedir que os animais atualmente saudáveis fiquem infetados. Distribua **Tetra Medica Contralck Plus** uniformemente no aquário de acordo com as quantidades indicadas abaixo:
1º dia: 20 gotas (1 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
2º dia: 20 gotas (1 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
3º a 6º dia: Não utilize. Alimente os peixes como habitualmente.
7º dia: 20 gotas (1 ml) por 100 l de água de aquário. Recomendamos que não alimente os peixes.
8º dia: Não utilize. Alimente os peixes como habitualmente. Mude parcialmente a água (30-50%). Após uma mudança parcial, recomendamos a utilização de carvão ativado para filtrar a água.

Recomendamos a repetição do tratamento logo de seguida, principalmente se os pontos brancos persistirem.

A descoloração da água deve-se à substância ativa e irá desaparecer ao fim de alguns dias.

Instruções para uma utilização adequada:
- Não use **Tetra Medica Contralck Plus** juntamente com outros medicamentos
- Se introduzir uma quantidade excessiva do produto no aquário, deve realizar uma mudança parcial da água correspondente à quantidade introduzida

Precauções especiais de conservação:
- Mantenha o medicamento longe da vista e do alcance das crianças.
- Guarde o produto na embalagem original.
- Mantenha o produto longe da luz solar.

Precauções especiais:
- Indicado apenas para o tratamento de animais.
- Não utilize após expirado o prazo de validade.
- Este produto não deve ser aplicado em crustáceos, camarões, caracóis, mexilhões e outros invertebrados, uma vez que pode originar intolerância.
- Pode ser nocivo para plantas de espécies delicadas como a Ceratophyllum genus.
- Medidas de precaução especiais para eliminar os medicamentos não utilizados:
- Elimine o produto e a respetiva embalagem num ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Informação revista:
outubro de 2017

S Information och bruksanvisning

Läkemedelsföretagare: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Tyskland, Tel. +49 (0) 5422/105-0, tillverkad i Tyskland, www.tetra.net

Tillverkare: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Tyskland

Tetra Medica Contralck Plus

Administreringssätt: Lösning för tillsats i akvarievatten

Mängd aktiva ingredienser per 1 ml lösning:
2,5 mg metyltioninium klorid, 1,0 mg malakitgrön-oxalat, 0,5 mg metylrosaninium klorid, 0,3 mg akriflavinium klorid

Användningsområden:
Vita prickjukan (ichthyophthirius multifiliis) och andra hud- och gälparasiter som trichodina och chilodonella.

Symtom:
Vita prickar eller fläckar på hud och fenor, skakiga och gnidande rörelser, klämda fenor, snabb andning, matta slemhinnor.

Kontraindikationer och biverkningar: Inga kända. Ägaren bör informera en veterinär eller apotekare om eventuella nyupptäckta biverkningar. Akvarieförsäljaren eller produktens tillverkare bör också informeras om biverkningarna.

Behandling av tropiska sötvattensfiskar

Doseringsanvisningar/appliceringssätt:
Skaka väl före användning.
Behandlingscykeln för **Tetra Medica Contralck Plus** är 8 dagar.
Se till att akvariet är väl luftat under behandlingen.
Stäng av eventuella UV-renare och ozonsystem.
Använd inte aktivt kol eller något annat absorberande filtermedium för att filtrera vattnet.
Om möjligt ska du rengöra filtret ordentligt före användning.
Se alltid till att utföra behandlingen medan akvariet är helt fyllt för att förhindra att för närvarande friska djur kommer att smittas senare.
Tillsätt **Tetra Medica Contralck Plus** jämnt fördelat i akvariet i de mängder som anges nedan:
Dag 1: 20 droppar (1 ml) per 100 l akvarievatten.
Du bör inte mata fiskarna.
Dag 2: 20 droppar (1 ml) per 100 l akvarievatten.
Du bör inte mata fiskarna.
Dag 3–6 Ingen applicering.
Utfoda normalt.
Dag 7: 20 droppar (1 ml) per 100 l akvarievatten.
Du bör inte mata fiskarna.
Dag 8: Ingen applicering.
Mata fiskarna normalt.
Utför ett delvattenbyte (30–50 %).
Efter delvattenbytet rekommenderar vi att du använder aktivt kol för att filtrera vattnet.

Vi rekommenderar att du upprepar behandlingen direkt efter, särskilt om vita prickjukan kvarstår.

Vattnets misfärgning orsakas av den aktiva substansen och försvinner efter ett par dagar.

Anvisningar för korrekt användning:
- Använd inte **Tetra Medica Contralck Plus** samtidigt med andra sjukdomsbehandlingar
- Om stora mängder av produkten har tillsatts i akvariet, utför ett delvattenbyte som motsvarar dessa mängder

Särskilda förvaringsanvisningar:
- Förvara utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvara i originalförpackningen.
- Skydda mot solljus.

Särskilda försiktighetsåtgärder:
- Endast för behandling av djur.
- Använd inte efter utgångsdatum.
- Denna produkt ska inte användas för kräftdjur, räkor, snigelar, musslor eller andra ryggradslösa djur eftersom det kan leda till intolerans.
- Kan vara skadlig för känsliga växter som ceratophyllum genus (hornwort).
- Särskilda försiktighetsåtgärder för bortskaffande av oanvända läkemedel:
- Lämna denna produkt och dess förpackning till ett insamlingsställe för farligt avfall.

Informationen uppdaterades:
oktober 2017

DK Information og brugsanvisning

Medicinalfirma: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Tyskland, tlf. +49 (0) 5422/105-0, Fremstillet i Tyskland, www.tetra.net

Producent: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Tyskland

Tetra Medica Contralck Plus

Anvendelse: Middel til tilsætning i akvarievand

Aktivstoffer pr. 1 ml af middel: 2,5 mg metylthioninium klorid, 1,0 mg malakitgrønt oxalat, 0,5 mg metylrosaninium klorid, 0,3 mg acriflavinium klorid

Anvendelsesområder: Hvide pletter (ichthyophthirius multifiliis) og andre hud- og gilleparasitter, som f.eks. Trichodina og Chilodonella.

Symptomer: Hvide pletter eller skjolder på hud og finner, usikre og gnubbende bevægelser, sammenklistrede finner, hurtig vejrtrækning, matte slimhinder.

Kontraindikationer og bivirkninger: Ingen kendte. Ved konstatering af hidtil ukendte bivirkninger bedes ejere af prydfisk informere dyrlæge eller farmaceut. Desuden bør forhandleren eller producenten informeres om eventuelle bivirkninger.

Lægemiddel til ferskvandsprydfisk

Doseringsanvisning/anvendelse: Rystes godt før brug. Behandlingen med **Tetra Medica Contralck Plus** tager 8 dage. Ved behandlingen skal akvariet ilte godt. Eventuelle UV-filtre og ozonanlæg skal slås fra. Der må ikke anvendes aktivt kul eller andre absorberende filterelementer til filtrering af vandet. Hvis muligt, skal filtret renses grundigt inden brug. Sørg altid for at forberede behandlingen, mens alle fisk er i akvariet, så raske fisk ikke bliver smittet efterfølgende. Dosér **Tetra Medica Contralck Plus** jævnt i akvariet i de mængder, som er angivet nedenfor:
1. dage: 20 dråber (1 ml) pr. 100 l akvarievand. Fiskene må ikke fodres.
2. dage: 20 dråber (1 ml) pr. 100 l akvarievand. Fiskene må ikke fodres.
3-6. dag: Ingen dosering. Giv fiskene foder som normalt.
7. dag: 20 dråber (1 ml) pr. 100 l akvarievand. Fiskene må ikke fodres.
8. dag: Ingen dosering. Giv fiskene foder som normalt. Foretag et delvist vandskift (30-50%). Efter delvist vandskift anbefaler vi at anvende aktivt kul til at filtrere vandet.

Det anbefales at gentage behandlingen umiddelbart efter, især hvis fiskene fortsat lider af hvide pletter.

Misfarvningen af vandet skyldes aktivstoffet og forsvinder efter nogle dage.

Brugsanvisning:
- Desuden må **Tetra Medica Contralck Plus** ikke anvendes sammen med andre lægemidler
- Hvis akvariet tilsættes for store mængder af produktet, skal der foretages et delvist vandskift svarende til de tilsatte mængder

Særlige krav til opbevaring:
- Skal opbevares utilgængeligt og uden for børns synsvidde.
- Opbevar produktet i originalindpakningen.
- Opbevar produktet beskyttet mod sollys.

Særlige forholdsregler:
- Kun beregnet til behandling af dyr.
- Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.
- Dette produkt må ikke anvendes til krebsdyr, rejer, snegle, muslinger eller andre hvirvelløse dyr, da det kan medføre allergi.
- Kan være skadeligt for sarte plantearter, som f.eks. hornblad (Ceratophyllum genus).
- Ved bortskaffelse af ubrugte lægemidler:
- Bortskaf produktet og emballagen som farligt miljøaffald.

Information ændret:
oktober 2017

N Opplysninger om bruk og bruksanvisning

Farmasøytisk foretak: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Tyskland, tlf. +49 (0) 5422/105-0, produsert i Tyskland, www.tetra.net

Produsent: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Tyskland

Tetra Medica Contralck Plus

Bruksmåte: Løsning som skal tilsettes akvarievannet

Aktive ingredienser per 1 ml løsning: 2,5 mg metyltioninklorid, 1,0 mg malakittgrøntoksalat, 0,5 mg metylrosaninklorid, 0,3 mg akriflavinklorid

Bruksområder: Hvitprikksyke (Ichthyophthirius multifiliis) og andre hud- og gjelleparasitter som Trichodina og Chilodonella.

Sykdomssymptomer: Hvite prikker e

Auftragsinformationen

IDL Worldwide

IDL Auftrags-Nr.:	400847154-F01	Status:	Freigabe				
Stichwort:	Tetra Medica Contralck Plus			Material-Nr.:	TH52418	Filmnr.: 1	Stanzkontur: 650X230MM
Druckerei:			Offset Printing	Rezeptur-Nr.:			Füllmenge: 20ml
Rasterweite:	Strich	Maßstab:	1:1	Datum: 15.03.2018	Warengruppe:	GEBRAUCHSANWEISUNG	Sprachversion: MO

Code-Arten:
Code-Nr.:
Proof-Ident.-Nr.:

IDL Kundenberater: Markus Amft
Telefon: +49 5321 3715538
e-mail: m.amft@idlww.de

Bemerkungen: **Achtung Strichcode ist Muster!** Bitte Codierung gemäß Druckspezifikation ersetzen.
Attention bar code is a sample! The encoding is only a reference! Please replace with specification for printing.

Bitte erteilen Sie nach Prüfung der Korrektur eine schriftliche Freigabe an Ihren Verpackungshersteller!

☑ Standproof
Nicht farbtonverbindlich . Nur zur Überprüfung von Stand- und Farbvertellung.
Not binding in colour. Only check layout and ink distribution.

☐ Proof
Der Proof ist farbverbindlich. Angaben von Sonderfarben dienen lediglich als Farb-Basiswert.
Die Farbtöne weichen prozess- und substratbedingt von der Farbvorgabe ab.
Simuliert den Druck auf gestrichenem Bedruckstoff. Keine Dichtemessung möglich.
The proof is reference for colour. The stated spot colours are only colour guide values.
Due to process and substrate being used the colouring deviates from the default colouring.
Simulates printing on coated printing material. No measuring of density possible.

100% 80% 40%
Black

Proof-Freigabe

Status	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift
FREI				

650 mm

230 mm

FIN Tiedot ja käyttöohjeet

Farmasia-alan yrittäjä: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Saksa, puh. +49 (0) 5422/105-0, Valmistettu Saksassa, www.tetra.net

Valmistaja: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Saksa

Tetra Medica Contralck Plus

Käyttötapa: Liuos akvaarioveteen lisättäväksi

Aktiivisten ainesten määrä 1 ml:ssa liuosta:
2,5 mg metyylioninkloridia, 1,0 mg malakiittivihreä-oksalaattia, 0,5 mg metyylirosanilinkloridia, 0,3 mg akriflavinkloridia

Kyttäkäuseet: Valkopilkkutauti (Ichthyophthirius multifiliis) ja muut iho- ja kidusloiset, kuten Trichodina ja Chilodonella.

Sairauden oireet: Valkoisia pilkkuja tai läikkiä ihossa ja evissä, epävarmat ja hankaavat liikkeet, supussa olevat evät, nopea hengitys, himmeät limakalvot.

Vastasyyt ja sivuvaikutukset: Ei tiedossa. Lemmikin omistajaa pyydetään kohtelaasti ilmoittamaan eläinlääkärille tai apteekkiin, jos havaitaan uusia sivuvaikutuksia. Myös lemmikkieläinten jälleenmyyjille tai tuotteen valmistajille tulisi tiedottaa mahdollisista sivuvaikutuksista.

Lääke makean veden akvaarioklaoille

Annosteluohjeet/käyttömenetelmä: Ravista hyvin ennen käyttöä. **Tetra Medica Contralck Plus**:an hoitojakso kestää 8 päivää. Varmista hoidon aikana, että akvaario on tuuletettu hyvin. Sammuta mahdolliset UV-levinpoistajat ja otsonijärjestelmät. Älä käytä aktiivihiilt tai muuta absorboivaa suodatinainetta veden suodattamiseen. Puhdista suodatin mahdollisuuksien mukaan asiankaitsevasti ennen käyttöä. Varmista aina, että hoito suoritetaan akvaarion ollessa täysin varustettuna, jotta parhaillaan terveiden eläinten tartuttaminen jälkkempiin vältettäisiin. Levitä **Tetra Medica Contralck Plus** tasaisesti akvaarion alla määrättyinä määrinä:
Päivä 1: 20 tippaa (1 ml) 100 litralle akvaariovettä. Sinua pyydetään olemaan ruokkimatta kaloja.
Päivä 2: 20 tippaa (1 ml) 100 litralle akvaariovettä. Sinua pyydetään olemaan ruokkimatta kaloja.
Päivät 3 – 6: Ei annostelua. Ruoki normaalisti.
Päivä 7: 20 tippaa (1 ml) 100 litralle akvaariovettä. Sinua pyydetään olemaan ruokkimatta kaloja.
Päivä 8: Ei annostelua. Ruoki normaalisti. Suorita osittainen vedenvaihto (30–50 %). Osittaisen vedenvaihdon jälkeen suosittelemme aktiivihiilen käyttöä veden suodattamiseen.

Hoidon toistoa suositellaan heti jälkeenpäin, erityisesti, jos valkopilkkutauti jatkuu.

Veden värjäintyminen johtuu aktiivisesta aineesta ja se katoaa muutamassa päivässä.

Ohjeet asianmukaiseen käyttöön:
- Älä käytä **Tetra Medica Contralck Plus** saa yhdessä muiden tautien lääkkeiden kanssa
- Jos tuotetta lisätään akvaarion liäkhlä määrä, suorita näitä osia vastaava osittainen vedenvaihto

Erityiset varotoimet varastoinnissa:
- Pidä tämä lääke poissa lasten ulottuvilta ja näkyvilltä.
- Varastoi tuote sen alkuperäispakkauksessa.
- Pidä tuote poissa auringonvalosta.

Erityiset varotoimet:
- Vain eläinten hoitoon.
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Tätä tuotetta ei tulisi käyttää kyrväisille, katkaravuille, kotiloille, simpukoille ja muille selkärangattomille, koska se voi johtaa ylinerkkyyteen.
- Saattaa vahingoittaa herkkiä kasvilajeja, kuten Ceratophyllum genus (kanvalehti).
- Erityiset varotoimenpiteet käyttämättömien lääkkeiden hävittämisessä: **Toimita tämä tuote ja sen pakkaus ongelmajätteen tai erityisjätteen vastaanottopaikkaan.**

Tiedot tarkastettu:
Lokakuu 2017

RUS Информация и инструкции по применению.

Фармацевтическое предприятие: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germany (Германия). Тел. +49-(0)-54-22-10-50. Сделано в Германии. www.tetra.net

Производитель: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany (Германия)

Tetra Medica Contralck Plus

Способ применения: добавить раствор в аквариумную воду.

Содержание активных ингредиентов в 1 мл раствора:
2,5 мг метилтиониния хлорида; 1,0 мг оксалата малахитовой зелени; 0,5 мг метилгиросаниллинхлорида; 0,3 мг акриафлавинхлорида

Области применения: белая соль (Ichthyophthirius multifiliis), а также паразитов кожными и жаберными паразитами, например, Trichodina и Chilodonella.

Симптомы заболевания: белая соль, образования на коже или плавниках, дрожь или трение о предметы, слипшиеся плавники, учащенное дыхание, замутненные слизистые оболочки.

Противопоказания и побочные эффекты: неизвестны. Владельцу рыб рекомендуется сообщить ветеринару или фармацевту о вновь выявленном побочном эффекте. Также необходимо уведомить о любых побочных эффектах продавца рыб или производителя продукта.

Средство для пресноводных тропических рыб

Инструкции по дозировке и способ применения: хорошо встряхните перед применением. Цикл лечения **Tetra Medica Contralck Plus** длится 8 дней. Во время лечения необходимо обеспечить хорошую аэрацию аквариума. Выключите все ультрафиолетовые лампы и озонаторные системы. Не используйте активированный уголь и другие абсорбирующие фильтрующие средства для фильтрации воды. Перед использованием очистите доступные части фильтра должным образом. При каждом лечении необходимо убедиться в том, что аквариум полностью укомплектован, чтобы предотвратить последующее заражение рыб, которые были здоровы на момент лечения. Равномерно распределите средство **Tetra Медика Контралк Плюс** в аквариуме в указанных ниже количествах.
День 1: 20 капель (1 мл) на 100 л аквариумной воды. Рекомендуется не кормить рыб.
День 2: 20 капель (1 мл) на 100 л аквариумной воды. Рекомендуется не кормить рыб.
День 3 – 6: не используйте. Придерживайтесь обычного режима кормления.
День 7: 20 капель (1 мл) на 100 л аквариумной воды. Рекомендуется не кормить рыб.
День 8: не используйте. Придерживайтесь обычного режима кормления. Выполните частичную замену воды (из 30–50%). После частичной замены воды рекомендуется использовать активированный уголь для фильтрации воды.

Сразу после этого повторите цикл лечения, особенно если белая соль сохранилась.

Активное вещество может стать причиной изменение цвета воды в течение нескольких дней.

Инструкции по надлежащему применению:
- не используйте средство **Tetra Медика Контралк Плюс** в сочетании с другими средствами от болезней рыб.
- В случае добавления в аквариум чрезмерного количества продукта выполните частичную замену воды в соответствии с количеством добавленного продукта.

Особые меры предосторожности при хранении:
- храните средство в недоступном для детей месте.
- Храните продукт в оригинальной упаковке.
- Не подвергайте продукт воздействию солнечных лучей.

Особые меры предосторожности:
- только для лечения животных.
- Не используйте средство после истечения срока хранения.
- Этот продукт не следует использовать для лечения беспозвоночных животных (раковобразных, креветок, улиток, медуз), т. к. средство может вызвать непереносимость.
- Может нанести вред чувствительным видам растений, например, растениям рода Ceratophyllum (роголистник).
- Особые меры предосторожности для утилизации неиспользованного средства: утилизируйте этот продукт и его упаковку в пункте сбора опасных или специальных отходов.

Последняя редакция: октябрь 2017 г.

Импортеры в РФ: ООО "Оптовая компания АКВА ПОЛО", 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57; ООО "Петсай", 196084 г. С.Петербург, ул. Ломакина д.11, лит. А, офис. 45-Н; АО "Балтия Пет Продакт", 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.42, комн.3134; ООО «Зоомагистр», 236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 21-32

PL Informacje i instrukcja stosowania

Podmiot farmaceutyczny: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Niemcy, Tel.: +49 (0) 5422/105-0, Wyprodukowano w Niemczech, www.tetra.net

Producent: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Niemcy

Tetra Medica Contralck Plus

Metoda podawania: Roztwór dodawany do wody akwariowej

Ilość składników aktywnych w 1 ml roztworu:
2,5 mg chlorku metylotioniny, 1,0 mg szczawianu – zieleni malachitowej, 0,5 mg chlorku metylorozaniliny, 0,3 mg chlorku tryparflawiny

Obszary stosowania: choroba wywoływana przez Whispovirus (Ichthyophthirius multifiliis) i inne pasożyty skóry i skrzeli, takie jak Chilodonella itp.

Objawy choroby: Białe kropki i plamki na skórze i płetwach, drżenie i ocieranie się, zaciśnięte płetwy, szybki oddech, zmętniałe błony śluzowe.

Przeciwwskazania i efekty uboczne: Brak znanych. Uprasza się właściciela zwierzęcia domowego o odpowiedzialne poinformowanie weterynarza lub farmaceuty o nowo stwierdzonych efektach ubocznych. O wszelkich efektach ubocznych należy również poinformować sprzedawcę zwierząt lub producenta wyrobu.

Środek leczniczy dla słodkowodnych ryb tropikalnych

Instrukcja dawkowania/metoda podawania: Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Cykl leczniczy z użyciem preparatu **Tetra Medica Contralck Plus** trwa 8 dni. Należy zadbać, aby podczas leczenia ryb akwarium było dobrze napowietrzone. Wyłączyć wszystkie sterylizatory UV oraz ozonatory. Nie stosować węgla aktywnego ani żadnego innego środka absorbującego do filtrowania wody. Jeśli tylko to możliwe, należy wyczyścić filtr przed użyciem. Należy bezwzględnie zapewnić, by leczenie było przeprowadzane przy pełnym zarybieniu zbiornika, co pozwoli zapobiec późniejszym zakażeniom u zwierząt, które obecnie są zdrowe. Rozprowadzić równomiernie preparat **Tetra Medica Contralck Plus** w akwarium w ilościach podanych poniżej:
Dzień 1: 20 kropli (1 ml) na każde 100 l wody w akwarium. Zaleca się nie karmić ryb.
Dzień 2: 20 kropli (1 ml) na każde 100 l wody w akwarium. Zaleca się nie karmić ryb.
Dni od 3 do 6: Nie podawać. Karmić jak zwykle.
Dzień 7: 20 kropli (1 ml) na każde 100 l wody w akwarium. Zaleca się nie karmić ryb.
Dzień 8: Nie podawać. Karmić jak zwykle. Przeprowadzić częściową wymianę wody (30–50%). Po częściowej wymianie zaleca się przefiltrować wodę za pomocą węgla aktywnego.

Zaleca się natychmiast powtórzyć leczenie, szczególnie jeśli choroba wywoływana przez Whispovirus się utrzymuje.

Zabarwienie wody wynika z działania substancji aktywnej i zniknie po kilku dniach.

Instrukcja prawidłowego stosowania:
- Nie należy stosować środka **Tetra Medica Contralck Plus** w połączeniu z innymi preparatami leczniczymi
- Jeśli do akwarium wprowadzono duże ilości produktu, należy przeprowadzić częściową wymianę wody odpowiadającą wprowadzonej ilości środka

Specjalne środki ostrożności związane z przechowywaniem:
- Trzymaj środek leczniczy w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu.
- Trzymaj produkt z dala od promieni słonecznych.

Specjalne środki ostrożności:
- Wyłącznie do leczenia zwierząt.
- Nie używać po upływie daty ważności.
- Produktu nie należy stosować do leczenia skorupiaków, krewetek, ślimaków, omułek ani innych bezkręgowców, gdyż może wywołać nietolerancję.
- Może być szkodliwy dla delikatnych gatunków roślin, np. z rodziny Ceratophyllum (rogatki).
- Specjalne środki ostrożności przy usuwaniu niewykorzystanego preparatu: - Produkt i jego opakowanie należy usuwać, przekazując do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Informacje zmodyfikowano:
Październik 2017 r.

CZ Informace a návod k použití

Farmaceutická společnost: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Německo, Tel. +49 (0) 5422/105-0, vyrobeno v Německu, www.tetra.net

Výrobce: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Německo

Tetra Medica Contralck Plus

Způsob podání: Roztok pro přidání do vody v akváriu

Podíl účinných látek na 1 ml roztoku: 2,5 mg chloridu methythioninia, 1,0 mg oxalátu malachitové zeleni, 0,5 mg chloridu methyfroxanilina, 0,3 mg chloridu akriflavinia

Oblasti použití: Bílá skvrnitost (Ichthyophthirius multifiliis) a další choroby způsobené kožními nebo žaberními parazity jako je Trichodina a Chilodonella.

Příznaky onemocnění: Bílá místa nebo skvrny na kůži a ploutvích, rozřešené a trhavé pohyby, sevřené ploutve, zrychlený dech, matné sliznice.

Kontraindikace a nežádoucí účinky: Nejsou známy. Žádáme majitele domácího zvířete, aby laskavě informoval jakéhokoliv veterináře nebo lékárníka o nově objevených nežádoucích účincích. O těchto účincích by měl být informován také prodejce domácích zvířat nebo výrobce přípravku.

Léčba sladkovodních tropických ryb

Pokyny k dávkování / způsob podání: Před použitím dobře protřepejte. Léčebný cyklus pro **Tetra Medica Contralck Plus** trvá 8 dní. V průběhu ošetření prosím zajistěte, aby se voda v akváriu dobře provzdušňovala. Vypněte všechny UV odkalovače vody a ozonizační systémy. Pro filtraci vody nepoužívejte aktivní uhlí ani žádné jiné absorpční filtrační médium. Pokud je to možné, filtr před použitím důkladně vyčistěte. Vždy zajistěte, aby léčba probíhala, když je akvárium plně osazeno rybami a zabránío se tak nakažení momentálně zdravých jedinců. Připravek **Tetra Medica Contralck Plus** dávkujte rovnoměrně do akvária, a to následujícím způsobem:
1. den: 20 kapek (1 ml) na 100 l vody v akváriu. Doporučuje se nekrmit ryby.
2. den: 20 kapek (1 ml) na 100 l vody v akváriu. Doporučuje se nekrmit ryby.
Dny 3 až 6: Nedávkuje se. Ryby krmte jako obvykle.
7. den: 20 kapek (1 ml) na 100 l vody v akváriu. Doporučuje se nekrmit ryby.
8. den: Nedávkuje se. Ryby krmte jako obvykle. Proveďte částečnou výměnu vody (30–50 %). Po provedení částečné výměny vody doporučujeme vodu zfiltrovat přes aktivní uhlí.

Doporučuje se postup vzápětí ještě jednou zopakovat, zejména pokud bílá skvrnitost přetrvává.

Obarvení vody je důsledkem působení aktivního uhlí a po několika dnech vymizí.

Návod ke správnému používání:
- Přípravek **Tetra Medica Contralck Plus** nepoužívejte ve spojení s jinými léčivy
- Pokud se do akvária přidá nadměrné množství výrobku, proveďte částečnou výměnu vody odpovídající tomuto množství

Zvláštní opatření při skladování:
- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
- Skladujte v originálním obalu.
- Uchovávejte mimo dosah slunečních paprsků.

Zvláštní upozornění:
- Není určeno pro člověka.
- Nepoužívejte po datu exspirace.
- Tento výrobek by se neměl používat u korýšů, krevet, plžů, slávek a jiných bezobratlých, neboť může způsobit nesnášenlivost.
- Může poškodit citlivé druhy rostlin, jako např. rod Ceratophyllum (růžkatec).
- Speciální preventivní opatření pro likvidaci nepoužitých přípravků: - Přípravek a jeho obal předejte k likvidaci na sběrných místech nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Datum poslední revize informací:
Říjen 2017

GR Πληροφορίες και οδηγίες χρήσης

Φαρμακευτική εταιρεία: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Γερμανία, τηλ. +49 (0) 5422/105-0, Almanya'da üretilmiştir, www.tetra.net

Κατασκευαστής: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Γερμανία

Tetra Medica Contralck Plus

Μέθοδος χορήγησης: Διάλυμα για προσθήκη στο νερό ενυδρείου

Δραστικά συστατικά ανά 1 ml διαλύματος: 2,5 mg κυανού του μεθυλενίου, 1,0 mg οξαλικού πράσινου μαλαχίτη, 0,5 mg φουκσιτολίκου κλόνας, 0,3 mg ακριφλαβίνης

Πεδία εφαρμογής: Λοίμωξα λευκών στιγμάτων (ιχθυοφθειρίασης - Ichthyophthirius multifiliis) και άλλα παράσιτα του δέρματος και των βράγχιων όπως Trichodina και Chilodonella.

Συμπτώματα της ασθένειας: Λευκά στίγματα ή κηλίδες στο δέρμα και στα πτερύγια, ασταθείς κινήσεις και κινήσεις ξυσίματος, μαζεμένα πτερύγια, ταχύπνοια, απώλεια του ζωηρού χρώματος των βλεννογόνων

Αντενδείξεις και παρενέργειες: Καμία γνωστή. Ζητείται από τον ιδιοκτήτη των ζώων να ενημερώσει ένα κτηνίατρο ή φαρμακοποιό σχετικά με οποιαδήποτε νέα παρενέργεια που παρατηρήσει. Ο ιδιοκτήτης του κατασκευαστής ζώων ή ο κατασκευαστής του προϊόντος θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε παρενέργειες.

Φάρμακο για τροπικά φάρια γλυκού νερού

Οδηγίες δοσολογίας/Μέθοδος εφαρμογής: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Ο κύκλος θεραπείας του **Tetra Medica Contralck Plus** διαρκεί 8 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, διασφαλίστε πως το ενυδρείο αερίζεται καλά. Απενεργοποιήστε οποιουδήποτε διαγωνιστήρες (clarifiers) UV και συστήματα όζοντος. Μη χρησιμοποιήσετε ενεργό άνθρακα ή οποιοδήποτε άλλο απορροφητικό υλικό φίλτρου για το φιλτράρισμα του νερού. Όποτε είναι εφικτό, καθαρίζετε καλά το φίλτρο πριν από τη χρήση. Θα πρέπει να βεβαιώνεστε πάντοτε πως η θεραπεία εκτελείται με όλα τα φάρια εντός του ενυδρείου, για να μην προσβληθούν οι δεύτερο χρόνο ζώα που είναι ήδη υγιή. Κατανείμετε ομοιόμορφα το **Tetra Medica Contralck Plus** στο ενυδρείο, με τις παρακάτω ποσότητες:
1. μέρα: 20 σταγόνες (1 ml) για 100 l νερού ενυδρείου. Συνιστώμε να μην τάιστε τα ψάρια.
Ημέρα 2: 20 σταγόνες (1 ml) ανά 100 l νερού ενυδρείου. Συνιστώμε να μην τάιστε τα ψάρια.
Ημέρες 3 έως 6: Δεν χορηγείται προϊόν. Τάιστε ως συνήθως.
Ημέρα 7: 20 σταγόνες (1 ml) ανά 100 l νερού ενυδρείου. Συνιστώμε να μην τάιστε τα ψάρια.
Ημέρα 8: Δεν χορηγείται προϊόν. Τάιστε ως συνήθως. Αντικαταστήστε μέρος του νερού (30–50%). Με τα μερικά αντικαταστάσεις του νερού, συνιστώμε να χρησιμοποιήσετε ενεργό άνθρακα για το φιλτράρισμα του νερού.

Συνιστάται επανάληψη της θεραπείας αμέσως μετά, ειδικά εάν η νόσος των λευκών στιγμάτων επμένει.

Η αλλαγή του χρώματος του νερού οφείλεται στο δραστικό συστατικό και θα εξαφανιστεί μετά από λίγες ημέρες.

Οδηγίες ενδεδειγμένης χρήσης:
- Μη χρησιμοποιείτε το **Tetra Medica Contralck Plus** μαζί με οποιαδήποτε άλλα φάρμακα
- Εάν προστεθεί υπερβολικές ποσότητες του προϊόντος στο ενυδρείο, αντικαταστήστε μέρος του νερού, που να αντιστοιχεί σε αυτές τις ποσότητες.

Ειδικές προφυλάξεις φύλαξης:
- Φυλάσσετε αυτό το φάρμακο σε μέρος που δεν προσεγγίζουν και δεν βλέπουν τα παιδιά.
- Αποθηκεύετε το προϊόν στην αρχική συσκευασία του.
- Φυλάσσετε το προϊόν προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία.

Ειδικές προφυλάξεις:
- Μόνο για θεραπεία ζώων.
- Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.
- Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε οστρακοειδή, γαρίδες, σαλιγκάρια, μύδια και άλλα ασπόνδυλα, καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσανεξία.
- Μπορεί να είναι επιβλαβές για ευαίσθητα είδη φυτών όπως το γένος Ceratophyllum.
- Ειδικά μέτρα προφύλαξης για την απόρριψη μη χρησιμοποιημένων φαρμάκων: - Το προϊόν αυτό και η συσκευασία του να συλλέγονται σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών απορριμάτων.

Αναθεώρηση πληροφοριών: Οκτώβριος 2017

TR Bilgiler ve kullanım talimatları

Farmasötik girişimci: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Almanya, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Almanya'da üretilmiştir, www.tetra.net

Üretici: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany

Tetra Medica Contralck Plus

Uygulama yöntemi: Akvaryum suyuna eklenen çözelti

1 ml çözelti başına etkin madde miktarı: 2,5 mg metiltiyoninyum klorür, 1,0 mg malaşit yeşili oksalat, 0,5 mg metilrosaniylum klorür, 0,3 mg akriflavinyum klorür

Uygulama alanları: Beyaz benek hastalığı (Ichthyophthirius multifiliis) ve Trichodina ile Chilodonella gibi deri ve solungaç parazitleri.

Hastalık semptomları: Deride ve yüzeçlerde beyaz benekler veya leke lar, sallanma ve sürtme hareketleri, kasılmış yüzeçler, hızlı solunma, mat mukoz membranlar.

Kontrendikasyonlar ve yan etkiler: Bilinen bir yan etki yoktur. Evcil hayvanın sahibinin, herhangi bir yeni keşfedilen yan etkiyi bir veteriner veya eczacıya bildirmesi rica olunur. Evcil hayvan satıcısı veya ürünün imalatçısı da yan etkiler hakkında bilgilendirilmelidir.

Tropik tatlı su balıkları için ilaç

Dozlama talimatları/Uygulama yöntemi: Kullanmadan önce iyice çalkalayın. **Tetra Medica Contralck Plus** tedavi döngüsü 8 gün sürer. Tedavi esnasında, akvaryumun iyi havalandırılmasını sağlayın. Her türlü UV durulucu ve ozon sistemini kapatın. Suyu filtrelemek için aktif karbon veya başka bir emici filtre malzemesi kullanmayın. Mümkünse, filtreyi kullanmadan önce uygun şekilde temizleyin. Tank tamamen doluyken henüz sağlıklı olan hayvanların sonradan enfekte olmasını önlemek için her zaman tedavinin gerçekleştiğinden emin olun.
Tetra Medica Contralck Plus çözeltisini akvaryum içine eşit olarak aşağıda belirtilen miktarlarda dökün:
1. gün: Her 100 l akvaryum suyu için 20 damla (1 ml). Balıkları beslemeyinız önerilir.
2. gün: Her 100 l akvaryum suyu için 20 damla (1 ml). Balıkları beslemeyinız önerilir.
3-6. günler: İlaç uygulanmaz. Normal şekilde besleyin.
7. gün: Her 100 l akvaryum suyu için 20 damla (1 ml). Balıkları beslemeyinız önerilir.
8. gün: İlaç uygulanmaz. Normal şekilde besleyin. Suyun bir kısmını değiştirin (%30-50). Suyun bir kısmını değiştirdikten sonra, suyu filtrelemek için aktif karbon kullanmanızı öneririz.

Özellikle benek hastalığı devam ederse, hemen ardından tedavinin tekrar edilmesi önerilir.

Etkin madde nedeniyle suda renklenme olur ve birkaç gün içinde yok olur.

Doğru kullanıma yönelik talimatlar:
- **Tetra Medica Contralck Plus** çözeltisini diğer hastalıklara yönelik ilaçlarla birlikte kullanmayın
- Akvaryuma gerekenden fazla miktarda ürün eklenmesi halinde, bu miktara eşdeğer orandaki suyu değiştirin

Özel saklama önlemleri:
- Bu ilacı çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde tutun.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Ürünü güneş ışığından uzak tutun.

Özel önlemler:
- Yalnızca hayvanların tedavisinde kullanılır.
- Son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın.
- Bu ürün, intoleransa yol açabileceği için kabukluklar, karides, salyangoz, midye ve diğer omurgasız hayvanlarda kullanılmamalıdır.
- Ceratophyllum cinsi (boynuzotu) gibi hassas bitki türlerine zarar verebilir.
- Kullanılmayan ilaçların imha edilmesine yönelik özel önleyici tedbirler: - Bu ürün ve ambalajını, tehlikeli veya özel atık toplama noktalarına atın.

Bilgi revizyon tarihi:
Ekim 2017

Anadolu Akvaryum ve Pet Ürünleri SAN. TIC. A.Ş.,
Kayişitli Mevkii, Samandıra Caddesi, No:28 34858,
TR - Büyükbakkalköy – Istanbul

RO Informații și instrucțiuni de utilizare

Antreprenor farmaceutic: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Germania, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Produs în Germania, www.tetra.net

Producător: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germany

Tetra Medica Contralck Plus

Mod de administrare: Soluție pentru adăugarea în apa de acvariu

Cantitatea de ingrediente active per 1 ml de soluție: 2,5 mg de clorură de metiltioniniu, 1,0 mg de oxalat de verde de malachit, 0,5 mg de clorură de metilrosaniliină, 0,3 mg de clorură de acriflaviniu

Domenii de aplicare:
Boala petelor albe (Ichthyophthirius multifiliis) și alți paraziți ai pielii și ai branhiilor, precum Trichodina și Chilodonella.

Simptome bolii:
Puncte albe sau pete pe piele și aripioare, mișcări greoaie și de frecare, aripioare strânse, respirație rapidă, membrane mucoase mate.

Contraindicații și efecte secundare: Necunoscute. Proprietarul animalelor este rugat să informeze un veterinar sau farmacist veterinar în legătură cu toate efectele secundare nou apărute. Magazinul de animale de companie sau producătorul produsului trebuie să fie, de asemenea, informați cu privire la orice efecte secundare.

Remedii pentru peștii tropicali de apă dulce

Instrucțiuni de dozare/Metodă de aplicare:
A se agita bine înainte de utilizare.
Ciclu de tratament pentru **Tetra Medica Contralck Plus** durează 8 zile.
În timpul tratamentului, asigurați-vă că acvariul este bine oxigenat.
Decuplați toate dispozitivele cu agent de limpezire UV și sistemele de ozon.
Nu utilizați cărbune activ sau orice alt material filtrant absorbant pentru a filtra apa.
Ori de câte ori este posibil, vă rugăm să curățați filtrul corect înainte de utilizare.
Asigurați-vă întotdeauna că tratamentul se efectuează în timp ce rezervorul este complet populat, pentru a preveni ulterior infectarea animalelor sănătoase.
Distribuiți **Tetra Medica Contralck Plus** uniform în acvariu în cantitățile prevăzute mai jos:
Ziua 1: 20 de picături (1 ml) la 100 l apă de acvariu.
Vă recomandăm să nu hrăniți peștii.
Ziua 2: 20 de picături (1 ml) la 100 l apă de acvariu.
Vă recomandăm să nu hrăniți peștii.
Zilele 3 - 6: Fără aplicare. Hrăniți normal.
Ziua 7: 20 de picături (1 ml) la 100 l apă de acvariu.
Vă recomandăm să nu hrăniți peștii.
Ziua 8: Fără aplicare. Hrăniți normal.
Schimbă partial apa (30-50%).
După schimbarea parțială a apei, vă recomandăm să utilizați cărbune activ pentru filtrarea apei.

Tratamentul repetat se recomandă imediat după aceea, în special dacă persistă boala petelor albe.

Decolorarea apei se datorează substanței active și va dispărea după câteva zile.

Instrucțiuni pentru o utilizare corespunzătoare:
- Nu folosiți **Tetra Medica Contralck Plus** împreună cu alte remedii medicamentoase
- Dacă se adaugă cantități excesive de produs în acvariu, efectuați o schimbare parțială de apă echivalentă cu aceste cantități

Măsuri de precauție speciale pentru păstrare:
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Păstrați produsul în ambalajul original.
- Protejați produsul depozitat de razele soarelui.

Măsuri de precauție speciale:
- Doar pentru tratarea animalelor.
- Nu folosiți după expirarea termenului de valabilitate.
- Acest produs nu trebuie utilizat la crustacee, creveți, melci, midii și alte nevertebrate, deoarece poate duce la intoleranță.
- Poate fi nocivă pentru specii și ambalajul aferent în punctele de colectare la deșeurilor periculoase sau speciale

Informații revizuite: Octombrie 2017

AR معلومات وإرشادات الاستخدام

متعهد المستحضرات الصيدلانية: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D - 49324 Melle، ألمانيا، هاتف رقم: +49 (0) 5422/105-0، صنع في ألمانيا، www.tetra.net

جهة التصنيع: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte، ألمانيا

Tetra Medica Contralck Plus

طريقة التناول: المحلول الذي يضاف إلى مياه حوض الأسماك

الكمية المستخدمة من المكونات الفعالة لكل 1 مل من المحلول: 2.5 ملغ من كلوريد ميثيل ثيونينيوم 1.0 ملغ من أكساليت أخضر الملاكيت 0.5 ملغ من كلوريد ميثيل روزانيلينيوم 0.3 ملغ من كلوريد أكريفلافينيم

مناطق الاستخدام: مرض النقط البيضاء (Ichthyophthirius multifiliis) وأمراض الفشور الأخرى وطفيليات الخياشيم مثل Trichodina و Chilodonella

أعراض المرض: وجود نقاط بيضاء أو رقعات على الفشور والزعانف، وحركات مهتزة وفرك، بالإضافة إلى ضيق التنفس، وانتفاس السريع، وشحوب الأغشية المخاطية.

موانع الاستعمال والأعراض الجانبية: لا يوجد شيء معروف، يطلب بكل احترام من مالك الحيوان الأليف من قبل الطبيب البيطري أو الصيدلي، الإبلاغ عن أي أعراض جانبية تم اكتشافها حديثًا كما يجب أيضًا أن يتم إبلاغ تاجر الحيوانات الأليفة أو الجهة المصنعة للمنتج بأي أعراض جانبية.

معالجة لأسماك المياه العذبة الاستوائية

توجيهات إعطاء الجرعة/طريقة استخدامها: قم برجه جيدًا قبل الاستخدام. تستمر دورة العلاج الخاصة **بـ Tetra Medica Contralck Plus** ثمانية أيام. أثناء العلاج، يرجى التأكد من أن حوض الأسماك جيد التهوية. قم بإغلاق أي مصابيح UV وأنظمة غاز الأوزون. لا تستخدم الكربون المنشط أو أي وسيلة تنقية امتصاص أخرى لتنقية المياه. قدر المستطاع، يرجى تنظيف الفلتر جيدًا قبل الاستخدام. تأكد دائمًا من أن العلاج ينفذ بينما يكون الخزان ممتلئ بالكامل أصابة أي حيوان بصحة جيدة الآن بالعدوى فيما بعد. قم بتوزيع **Tetra Medica Contralck Plus** بشكل متساوي في حوض الأسماك بالكميات المحددة بالأسفل:
اليوم الأول: 20 قطرة (1مل) لكل 100 لتر من مياه حوض الأسماك. تنصح بعدم تغذية الأسماك.
اليوم الثاني: 20 قطرة (1مل) لكل 100 لتر من مياه حوض الأسماك. تنصح بعدم تغذية الأسماك.
اليوم الثالث إلى السادس: لا تستخدم. قم بالتغذية كالمعتاد.
اليوم السابع: 20 قطرة (1مل) لكل 100 لتر من مياه حوض الأسماك. تنصح بعدم تغذية الأسماك.
اليوم الثامن: لا تستخدم. قم بتغيير جزئي للمياه (30-50%). بعد التغيير الجزئي للمياه نوصيك باستخدام الكربون المنشط لتنقية المياه.

بعد ذلك ينصح بتكرار العلاج بشكل مباشر، وخاصة في حالة استمرار مرض النقاط البيضاء.

ان تغيير لون المياه ناتج من المواد النشطة وسيختفي بعد بضعة أيام.

توجيهات للاستخدام السليم:
- لا تستخدم **Tetra Medica Contralck Plus** بالتزامن مع أي علاجات أمراض أخرى.
- إذا تمت إضافة كميات زائدة من المنتج إلى حوض الأسماك، قم بإجراء تغيير جزئي للمياه مساوياً لتلك الكميات.

احتياطات التخزين الخاصة:
- احفظ هذا العلاج بعيدًا عن متناول أيدي ونظر الأطفال.
- خزن المنتج في داخل ع